


Censo de Malezas

Introducción: durante las últimas campañas las malezas sean transformado en una gran problemática para los productores agropecuario, llevando se gran parte de su rentabilidad. La empresa Dupont en un trabajo en conjunto con Lares SRL llevo adelante en las dos últimas campañas un **Censo de Malezas** en la zona central del país.

Objetivo: censar las especies malezas presentes en lotes de producción destinados a los cultivos de soja y maíz. Se evaluaron distintos parámetros poblacionales que ayudaron a interpretar su dinámica y por consiguiente su manejo



Materiales y Métodos: se seleccionaron lotes de producción que fueron visitas en 3 momentos (julio, septiembre-octubre y diciembre). En cada visita se evaluaron los parámetros de: especie presente, estado de desarrollo, % de cobertura y frecuencia poblacional.

Resultados: a continuación se muestran los resultados de frecuencia de las distintas familias de malezas. También se muestran datos de cobertura y estado de desarrollo de **Rama Negra** en cada zona monitoreada.

Zona	Frecuencia (%)		
	Gramíneas	H. Ancha	Perennes
BA_C	21	71	8
BA_N	20	75	5
CB_SE	16	71	12
ER_S	17	72	10
SF_S	10	89	1
SF_C	16	77	8

Conclusiones:

*Aparición en todo el país de malezas resistentes a glifosato.

*Especialmente Rama Negra en todas las zonas.

*Se refuerza el concepto de que importante es: conocer a las malezas, su identificación, biología y control.

Zona	Visita	Cobertura Promedio		
		Estadio inicial	Roseta-Macollaje	Elong.+ Rep.
BA_C	1	14,2	12,2	12,5
BA_C	2	7,9	11,8	0,0
BA_C	3	15,0	4,4	0,0
BA_N	1	6,6	13,3	20,0
BA_N	2	2,5	7,3	0,0
BA_N	3	8,5	6,5	0,0
CB_SE	1	2,8	4,7	7,0
CB_SE	2	1,0	2,9	8,5
CB_SE	3	0,0	1,2	6,8
ER	1	5,0	15,1	0,0
ER	2	4,0	7,4	23,1
ER	3	1,0	9,1	1,0
SF_C	1	1,0	3,1	5,5
SF_C	2	1,3	1,8	4,4
SF_C	3	0,0	2,0	6,5
SF_S	1	2,9	19,4	0,0
SF_S	2	3,9	3,0	0,0
SF_S	3	4,5	4,5	0,0